第三次作业反馈

$(2024\text{-}2025\text{-}1)\text{-}\mathrm{MATH}1405\mathrm{H}\text{-}02$

Monday 21st October, 2024

目录

| 1 | 第一题解答 | 1 |
|---|---------|---|
| 2 | 第二题解答 | 3 |
| 3 | "挑战题"解答 | 5 |

1 第一题解答 1

1 第一题解答

矩阵的零空间,解空间,秩,以及相抵等性质与域的选取无关.

备注. 一个常见的错误是出现 $\frac{1}{2}$. 在一般的域中, 能否定义 $\frac{1}{2}$?

问题 1.1. 交换 A 的 [i,j] 两行, 等价于左乘一个矩阵 $S_{i,j}$. 写出该矩阵.

解答 假定 i < j. 以下斜逗号 \cdot . 处为 1, 空白处为 0.

简化地, $S_{i,j} = I - E_{i,i} - E_{j,j} + E_{i,j} + E_{j,i}$.

问题 1.2. 将 A 第 k 行的各项同时乘上一个非零常数 λ , 等价于左乘一个矩阵 D_k^{λ} . 写出该矩阵. **解答** 以下斜逗号 ··· 处为 1, 空白处为 0.

简化地, $D_k^{\lambda} = I + (\lambda - 1)E_{k,k}$.

问题 1.3. 向 A 的第 j 行加上其第 i 行的 λ 倍 (这一过程仅改变第 j 行, 其他行不变), 等价于左乘一个矩阵 $T_{i,j}^{\lambda}$. 写出该矩阵.

解答 不妨设 i < j. 以下斜逗号 ··. 处为 1, 空白处为 0.

简化地, $T_{i,j}^{\lambda} = I + \lambda E_{j,i}$.

问题 1.4. 求逆变换 (逆矩阵) $S_{i,j}^{-1}$, $(D_k^{\lambda})^{-1}$, 以及 $(T_{i,j}^{\lambda})^{-1}$. 解答 依次解答如下.

- 1. 注意到 $(S_{i,j})^2 = I$, 故 $S_{i,j}^{-1} = S_{i,j}$.
- 2. 注意到 $(D_k^{\lambda})^{-1} = D_k^{1/\lambda}$.
- 3. 注意到 $(T_{i,i}^{\lambda})^{-1} = T_{i,i}^{-\lambda}$.

1 第一题解答 2

问题 1.5. 使用自然语言描述这三类逆变换.

解答 依次回答如下.

- 1. $S_{i,j}^{-1}$ 的定义: 换回 [i,j] 两行, 也就是交换矩阵的 [i,j] 两行.
- 2. $(D_k^{\lambda})^{-1}$ 的定义: 将矩阵的第 k 行由数乘后的结果复原, 也就是在第 k 行各项同时乘上非零常数 $1/\lambda$.
- 3. $(T_{i,j}^{\lambda})^{-1}$ 的定义: 在矩阵的第 j 行中剔除第 i 行的 λ 倍, 也就是向 A 的第 j 行加上其第 i 行的 $-\lambda$ 倍 (这一过程仅改变第 j 行, 其他行不变).

问题 **1.6.** 求 $S_{i,j}S_{k,l} = S_{k,l}S_{i,j}$ 的充要条件.

解答 由构造, $S_{i,j}$ 与 $S_{j,i}$ 无区别, $S_{i,i} = I$. 为找到以上两个矩阵乘积不交换的充要条件, 只需讨论 $i \neq j$ 且 $k \neq l$ 的三种情形.

- 1. (i, j, k, l) 两两不等.
- 2. (i, j, k) 两两不等, i = l.
- 3. $i = k \perp j = l$.

只有第二种情形是非交换的. 记 | S | 为有限集的大小,则第二种情况等价于

$$|\{i,j\}| = 2 \quad \mathbb{E} |\{k,l\}| = 2 \quad \mathbb{E} |\{i,j,k,l\}| = 3.$$
 (1.4)

换言之, 以上乘积可交换的充要条件是

• 两个矩阵的"作用范围"全不交,或一者包含另一者.

问题 1.7. 求 $T_{i,j}^{\lambda} T_{k,l}^{\mu} = T_{k,l}^{\mu} T_{i,j}^{\lambda}$ 的充要条件.

解答 依照 $T_{i,j}^{\lambda} = I + \lambda E_{j,i}$, 得

$$T_{i,j}^{\lambda} T_{k,l}^{\mu} - T_{k,l}^{\mu} T_{i,j}^{\lambda} = (I + \lambda E_{j,i})(I + \mu E_{l,k}) - (I + \mu E_{l,k})(I + \lambda E_{j,i})$$
(1.5)

$$= \lambda \mu (E_{j,i} E_{l,k} - E_{l,k} E_{j,i}). \tag{1.6}$$

上式为 0 的充要条件是以下任意一者成立:

- 1. $\lambda \mu = 0;$
- 2. $i \neq j$ 且 $k \neq j$ (两处 0 相减);
- 3. i = j = k = l (两处 1 相减).

问题 1.8. 以上给出了三类矩阵. 能否通过某两类矩阵得到第三类? 请讨论这三种情况 (构造或给出反例).

• 另注: "给出反例"的本质还是证明. 原问题表述欠妥.

2 第二题解答 3

解答 S 类能通过 T 类与 D 类得到, 其机理类似赋值 (a,b) := (b,a). 记

$$A := D_i^{-1} \cdot T_{i,i}^1 \cdot T_{i,i}^{-1} \cdot T_{i,j}^1, \tag{1.7}$$

此时 A 的左乘表现为以下的映射的合成:

$$(x_i, y_j) \xrightarrow{T_{i,j}^1} (x_i, x_i + y_j) \xrightarrow{T_{j,i}^{-1}} (-y_j, x_i + y_j) \xrightarrow{T_{i,j}^1} (-y_j, x_i) \xrightarrow{D_i^{-1}} (y_j, x_i). \tag{1.8}$$

T 类不能通过 S 类与 D 类得到. 因为 S 类矩阵与 D 类矩阵的任意乘积都至少有 n^2-n 个零. 若假定 $T_{i,i}^{\lambda}$ 是合法的, 则 D 类矩阵能通过 S 类与 T 类得到. 因为 $D_i^{\lambda} = T_{i,i}^{\lambda-1}$.

若假定 $T_{i,i}^{\lambda}$ 是非法的 (假定 $n \geq 2$), 则有且仅有行列式为 ± 1 的 D 类矩阵能被其余两类矩阵表示. 对行列式为 -1 的 D 类矩阵进行如下 S-类与 T-类的初等行变换即可:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{1.9}$$

若 D 类矩阵的行列式不为 ± 1 , 则其无法通过 S 类与 T 类矩阵的乘积得到. 因为 $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

• 对于二元域或三元域上的矩阵, D 类矩阵可以通过其他两类矩阵得到.

问题 1.9. 假定 A 是方阵. 将以上 $S_{i,j}$, $T_{i,j}$ 与 D_k 乘在 A 的右侧, 效果如何? **解答** 解答如下.

- 1. $S_{i,i}$ 右乘: 交换 A 的 i 列与 i 列;
- 2. $T_{i,i}^{\lambda}$ 右乘: 将 i 列的 λ 倍加至 j 列;
- 3. D_k^{λ} 右乘: 将第 k 列乘以 λ .

2 第二题解答

问题 2.1. 给定矩阵 A, 其最简行阶梯形 R 为何唯一? **解答** 见下一问.

问题 2.2. (接上一小问) 尝试给出一个不用计算的证明 (无字证明).

解答 从 A 到 rref(A) 可通过"改写矩阵各列"实现, 无需进行复杂的初等行变换.

以下算法从左往右地读取 A 的各列, 并逐列给出 rref(A). 记 A 共有 n 列, 且第 k 列为向量 v_k .

输入: 矩阵 A 各列 $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$;

输出: 最简行阶梯形 $\operatorname{rref}(A)$ 各列 $\{c_1, c_2, \ldots, c_n\}$.

对于 k = 1, 2, ..., (A 的列数).

若 $v_k \in \text{Span}(\{v_k\}_{t \le k})$, 则 c_k 的坐标由 $\{c_t\}_{t \le k}$ 唯一确定.

若不然, 则取 c_k 是为 $\{0,1\}$ -向量 e_{t+1} , 其中 $t = \dim \operatorname{Span}(\{v_k\}_{t \le k})$.

注: 请回忆 $\operatorname{Span}(\emptyset) = 0$, 从而以上算法是精简且统一的. 空集起到了 void 的效果.

2 第二题解答 4

问题 2.3. 转置矩阵 R^T 的最简行阶梯形是什么?

解答 这等价于说, 先在 R 中消去所有 1 (阶梯拐角) 右侧的项, 再将所有零向量移至非零向量的右侧. 因此, R^T 的最简阶梯型是

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}. \tag{2.1}$$

问题 2.4. 证明相抵标准型的存在性: 对任意矩阵 A, 存在可逆矩阵 P 和 Q 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q. \tag{2.2}$$

以上, I_r 是 r 阶单位矩阵, O 表示数字 0 出现的位置.

注意: 中间的 (0,1)-矩阵兼并了以下三类退化矩阵

$$\begin{pmatrix} I_r & O \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} I_r \\ O \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} I_r \end{pmatrix}.$$
 (2.3)

解答 上一问已给出答案.

问题 2.5. 证明以上的 r 由 A 唯一决定. 作为推论, 矩阵的行秩等于列秩. 往后统一称作秩.

此类分解不必来自矩阵的初等行列变换,从而不能使用消元法的唯一性证明. 在证明相抵标准型的唯一性之前,使用各类"秩不等式"或有循环论证之嫌. 最好的方法是反证法.

解答 若存在可逆的 P_1, P_2, Q_1, Q_2 使得

$$A = P_1 \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q_1 = P_2 \begin{pmatrix} I_s & O \\ O & O \end{pmatrix} Q_2. \tag{2.4}$$

若 r < s, 改写等式得

$$P_2^{-1}P_1\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}Q_1Q_2^{-1} = \begin{pmatrix} I_s & O \\ O & O \end{pmatrix}. \tag{2.5}$$

考虑 $\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r \\ O \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_r & O \end{pmatrix}$,则上式改写作

$$M \cdot N = \begin{pmatrix} I_s & O \\ O & O \end{pmatrix} \quad (M \in \mathbb{F}^{m \times r}, \ N \in \mathbb{F}^{r \times n}). \tag{2.6}$$

将矩阵左乘视作 \mathbb{F}^n 至 \mathbb{F}^m 的线性映射, 则

• 左乘 $M \cdot N$ 必然将 s 个线性无关的行向量映作线性相关组 (因为 N 总共仅有 r 行);

• 考虑
$$\{e_1,\ldots,e_s\}$$
, 则左乘 $\begin{pmatrix} I_s & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 保持这一线性无关组.

综上, 原等式矛盾. 因此 r > s. 类似的论证给出 r < s, 从而 r = s.

3 "挑战题"解答 5

3 "挑战题"解答

问题 3.1. 若整数矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 满足 ad-bc=1, 则 A 是以下几类矩阵的有限乘积

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{3.1}$$

解答 依题设, 直接得到 T^k $(k \in \mathbb{Z})$. 因此可以将 A 第二行的任意倍数加至第一行. 计算得

$$STS = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad ST^{-1}S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \tag{3.2}$$

因此可以将 A 第一行的任意倍数加至第二行. 若考虑右乘, 则可以将 A 某列的任意倍数加至另一列. 同时, S 起到了行置换与列置换的作用.

- 若 A 不存在 0, 则不妨设 A 的第一列非零. 依照行列式, 该列的两数互质. 通过上述变换, 可将 A 中某项消作 0.
- 若 A 中存在一个 0,则可以通过上述变换将 A 变作上三角矩阵. 依照行列式,两个对角元只能是±1. 依照初等变换,可以将 A 变作对角矩阵.
- 若 A 中存在两个零, 则 S 或 SA 是对角矩阵. 最后依照 $S^2 = -I$, 明所欲证.